

# Neskorý výskyt strakoša červenochrbtého (*Lanius collurio*)

## *Late occurrence of the Red-backed Shrike (Lanius collurio)*

Jozef LENGYEL<sup>1</sup> & Helena IMRICHOVÁ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nitriansky Hrádok, Za kostolom 2, 942 01, Šurany, Slovensko; lengyel@soprsr.sk

<sup>2</sup>Stará cesta 675, 946 52 Imeľ, Slovensko

Zo zimného, resp. neskoro jesenného obdobia nie je veľa údajov o výskyte druhu *Lanius collurio*. Napr. 1. 11. 1968 – 1 ex., Piešťany, pozoroval V. Kubán (Kaňuščák 1970), 9. 11. 1945 – 1 ex., Šamorín – Mliečno (Ferianc 1979), 10. 11. 1968, 1 ex., Piešťany „Bažantnica“, ulovený (Kaňuščák 1970), 21. 12. 1971 – 1 ex., Sĺňava pri Piešťanoch (Kubán & Duffek 1987), 18. 12. 1995 – pozorovaný 1 letu neschopný samec, Devínske Jazero „Šrek“ (Zuna-Kratky et al. 2000), 13. 1. 1971 – bez bližších podrobností pozorovania, Piešťany, V. Kubán (Hudec 1983).

Dňa 3. 11. 2005 sme pozorovali 1 ex. na lokalite prírodná rezervácia Alúvium rieky Žitavy (katastrálne územie obce Martovce, DFS 8174d). Zdržoval sa v korunách hlavových vrb, na severnom okraji inundačného územia Žitavy. Striehol na hmyz zdržiavajúci sa na príľahlej hrádzi a nejavil veľkú plachosť. Prevládalo suché, slnečné a relatívne teplé počasie (cca do 10 °C). Na blízkej hrádzi boli aktívne a čulé niektoré druhy koníkov a kobyliiek (Orthoptera), podobne v ovzduší boli aktívne niektoré skupiny hmyzu (Odonata, Diptera). Strakoš bol v dobrej kondícii, s úplným operením (bez prejavov hendikepu). Po približne 5 min. pozorovaní sa nám stratil (doba pozorovania približne od 11:30). Jednalo sa o hnedo sfarbeného jedinca (samica alebo immat. jedinec). V korunách hlavových vrb (kde sa zdržiaval strakoš) boli zároveň pozorované jesenné lovné zoskupenia spevavcov a d'atľov (*Regulus regulus* – 2 ex., *Parus major*

– cca 15 ex., *Parus caeruleus* – cca 10 ex., *Sitta europaea* – min. 2 ex., *Dendrocopos major* – 3 ex., *Picus viridis* – 1 ex.). Biotopmi v mieste pozorovania boli zaplavené trstové močiare, na periférii s líniovými porastami hlavových vrb a v širšom okolí so skupinami topoľov čiernych, vrb a ojedinele tvrdých listnáčov. Strakoš červenochrbtý je na danej lokalite pravidelným hniezdičom. Pozorovanie strakoša v blízkosti obce Martovce zrejme súviselo s dlhodobjšie trvajúcim relatívne teplým jesenným počasím v r. 2005.

### Pod'akovanie

Za poskytnuté literárne údaje ďakujeme P. Rácovi.

### Literatúra

- FERIANC O. 1979: Vtáky Slovenska 2. — VEDA, Bratislava.
- HUDEC K. (eds.) 1983: Fauna ČSSR. Ptáci III/2. — Academia, Praha.
- KAŇUŠČÁK P. 1970: Niekoľko poznámok k výskytu niektorých vtákov z okolia Piešťan. — Ochrana fauny 4 (20): 70.
- KUBÁN V. & DUFFEK K. 1987: Zimovanie vtáctva na vodnej nádrži „Sĺňava“ a v okolí Piešťan. — Tichodroma 1: 12–81.
- ZUNA-KRATKY T., KALIVODOVÁ E., KÜRTHY A., HORAL D. & HORÁK P. 2000: Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. — Distelverein, Deutsch-Wagram.

Došlo: 24. 2. 2006

Prijaté: 6. 7. 2006